

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الموعد العادي 2016
- عناصر الإجابة -

NR 34

ROYAUME DU MAROC
ROYAUME DU MAROC
ROYAUME DU MAROC



المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتعليم العالي

المركز الوطني للتقويم
والامتحانات والشؤون

3	مدة الإجابة	علوم الحياة والأرض	المادة
5	المعامل	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية	الدرجة أو المسلك

السؤال	عناصر الإجابة	النقطة
المكون الأول (5 نقط)		
I	- التحول : ظاهرة جيولوجية تؤدي إلى تغير كل من التركيب المعدني وبنية صخور في حالتها الصلبة تحت تأثير تغير ظروف الضغط ودرجة الحرارة - المعدن المؤشر : معدن يمكن من تحديد ظروف الضغط ودرجة الحرارة السائدة أثناء تشكل الصخرة التي تحتوي عليه ذكر خاصيتين من قبيل : 1- سلاسل انظر : وجود حفر محيطية - حدوث بركانية أنيزوتروبية - توزيع مائل للطور الزلزالية - متتالية صخرية تحولية (الشيست الأخضر - الشيست الأزرق - الكلوغيت) 2- الكرانيت الأناتيكلي : مساحته شاسعة - يتشكل في عمق كبير - حدوده غير واضحة مع الصخور المتحولة - مرتبط بالتحول الدينامي الحراري	0.5 ن 0.5 ن
II	1- سلاسل انظر : وجود حفر محيطية - حدوث بركانية أنيزوتروبية - توزيع مائل للطور الزلزالية - متتالية صخرية تحولية (الشيست الأخضر - الشيست الأزرق - الكلوغيت) 2- الكرانيت الأناتيكلي : مساحته شاسعة - يتشكل في عمق كبير - حدوده غير واضحة مع الصخور المتحولة - مرتبط بالتحول الدينامي الحراري	0.5 ن 0.5 ن
III	- الاختيار من متعدد : (1 أ ج) ؛ (2 ب) ؛ (3 د) ؛ (4 ب)	2 ن
IV	المزاوجة : أرقام عناصر المجموعة 1 الحرف الذي يشير إلى التعرف	1 ن

المكون الثاني (15 ن)

التمرين الأول (5 نقط)

I	مقارنة مع الشخص الممارس لأنشطة رياضية، يلاحظ عند الشخص غير الممارس لأي نشاط رياضي : • انخفاض في الحجم الإجمالي للميتوكوندريات وضعف نشاطها الأنزيمي • ارتفاع كمية الحمض اللبني المنتج وانخفاض استهلاك ثاني الأوكسجين	0.25 ن 0.25 ن
	التفسير : الشخص غير الممارس لأي نشاط رياضي يوظف أساسا المسلك اللاهوائي كمصدر لتجديد ATP، مما يجعل إنتاجية ATP ضعيفة، وهذا ما يفسر ارتفاع قابليته لتعب	0.5 ن

الصفحة 2 4	NR 34	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2016 - عناصر الإجابة - مادة: علوم الحياة والأرض - شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية	
0.5 ن	2	عند التلاميذ غير المدخنين، تكثر VMA بـ 15.8UA في حين عند التلاميذ المدخنين لا تتجاوز VMA قيمة 14.5UA . وبالتالي فقدرة التحمل عند المدخنين أقل من نظيرتها لدى غير المدخنين.....	
0.5 ن 1 ن	3	• مقارنة مع التلاميذ غير المدخنين، يلاحظ عند التلاميذ المدخنين انخفاض حجم ثاني الأوكسجين (O_2) المذيت على الخطاب الهوي وارتفاع حجم أحادي أكسيد الكربون (CO) المنقول بواسطة الدم. • ارتباط CO بالمركب Fe^{2+} ← توقف تدفق الإلكترونات عبر مركبات السلسلة التنفسية إلى ثاني الأوكسجين ← عدم ضخ بروتونات H^+ من الميتوكوندريا إلى الحيز الشيفتالي ← عدم تشكل ميل H^+ ← توقف نشاط الكرة ذات شمراخ وعدم تركيب ATP	
0.5 ن 1.5 ن	4	عند التلاميذ المدخنين، يلاحظ ارتفاع كبير تركيز الحمض اللبني وانخفاض pH بالدم الوربي الشعائر العضلة بعد القيام بمجهود عضلي. • يؤدي التدخين إلى تزويد العضلات بكمية مهمة من CO (بدل O_2) ← يثبت CO على الشفافة T للسلسلة التنفسية ← انخفاض تركيب ATP عبر المسلك الحيواني ← توظيف العضلة لتخزين اللبني ← إنتاج الحمض اللبني يؤدي إلى انخفاض pH الدم المغادر للعضلة. • انخفاض نشاط أنزيمات الاستقلاب الهوائي ← إنتاج كمية ضعيفة من ATP ← الإصابة بالعياء وكثرة التشنجات.....	
المعبرين الثاني (5 نقط)			
0.25 ن 0.25 ن 0.25 ن 0.25 ن 0.5 ن	1	الشكل أ : التهديدية الأولى ← تشكل رباعين الشكل ب: الانفصالية الأولى ← حدوث هجرة للصيغيات المتماثلة دون انشطار الجزيه المركزي..... الشكل ج: الانفصالية الثانية ← حدوث هجرة للصيغيات بعد انشطار الجزيه المركزي. الشكل د: الاستوائية الثانية ← الصفيحة الاستوائية مكونة من 2 صبغي مضاعف..... استنتاج: يتعلق الأمر بظاهرة الانقسام الاختزالي.	
0.5 ن 0.5 ن	2	إنجاز رسم تخطيطي صحيح لاحتمال الثاني للانفصالية الأولى. الظاهرة المسؤولة عن الاحتمالين هي ظاهرة الإقتران المستقل لتحليلات (التخفيف البصيفي) التي تؤدي إلى تنوع الخبر الوراثي للخلايا البنات (الأمشاج) الناتجة عن الانقسام الاختزالي وبالتالي تؤدي إلى التنوع الوراثي للأفراد.....	
0.25 ن 0.25 ن 0.25 ن 0.25 ن	3	استثمار نتائج التزاوج الأول: - الهجونة ثنائية: دراسة انتقال صفتين وراثيتين - السيادة تامة (مطلقة) للحليلين المسؤولين عن عيون حمراء R و أجنحة قائمة D على الحليلين المتنحيين المسؤولين عن عيون أرجوانية r وأجنحة منحنية d. ← التحليل: أفراد الجيل الأول لهم عظم أيوي عيون حمراء وأجنحة قائمة - F_2 متجانسين ← الآباء من سلالتين نقيتين حسب القانون الأول لمندل - التزاوج العكسي يعطي نفس النتيجة ← وراثية غير مرتبطة بالجنس	
استثمار نتائج التزاوج الثاني: - يتعلق الأمر بتزاوج راجع (فرد من F_2 مع أب ثنائي المتنحي) أعطى خلفا يتضمن 4			

الصفحة 3 4	NR 34	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2016 - عنصر الإجابة - مادة: علوم الحياة والأرض - شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية																	
0.5	مظاهر خارجية بنسب متباينة: 77% مظاهر أنوية و 23% مظاهر جديدة التركيب ← المورتلان المدروستين مرتبطتان (ارتباط غير مطلق) نتج عنه حدوث ظاهرة العبور (الصغير).....																		
0.25	4 التفسير الصبغي للتزاوج الثاني: $P_1 \times P_2$ المظهر الخارجي: $[R, D]$ $[r, d]$ النمط الوراثي للأباء: $\frac{R}{r} \frac{D}{d}$ $\frac{r}{r} \frac{d}{d}$ الأنشاج: $\frac{R}{39\%} \frac{D}{12\%} ; \frac{R}{11\%} \frac{d}{38\%} ; \frac{r}{38\%} \frac{D}{100\%}$ شبكة التزاوج: <table border="1"> <tr> <td>rP_1</td> <td>$\frac{R}{39\%} \frac{D}{12\%}$</td> <td>$\frac{R}{11\%} \frac{d}{38\%}$</td> <td>$\frac{r}{38\%} \frac{D}{100\%}$</td> </tr> <tr> <td>$rP_2$</td> <td>$\frac{R}{39\%} \frac{D}{12\%}$</td> <td>$\frac{R}{11\%} \frac{d}{38\%}$</td> <td>$\frac{r}{38\%} \frac{D}{100\%}$</td> </tr> <tr> <td>$\frac{r}{100\%} \frac{d}$</td> <td>$[R, D] 39\%$</td> <td>$[R, d] 12\%$</td> <td>$[r, D] 11\%$</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>$[r, d] 38\%$</td> </tr> </table>			rP_1	$\frac{R}{39\%} \frac{D}{12\%}$	$\frac{R}{11\%} \frac{d}{38\%}$	$\frac{r}{38\%} \frac{D}{100\%}$	rP_2	$\frac{R}{39\%} \frac{D}{12\%}$	$\frac{R}{11\%} \frac{d}{38\%}$	$\frac{r}{38\%} \frac{D}{100\%}$	$\frac{r}{100\%} \frac{d}$	$[R, D] 39\%$	$[R, d] 12\%$	$[r, D] 11\%$				$[r, d] 38\%$
rP_1	$\frac{R}{39\%} \frac{D}{12\%}$	$\frac{R}{11\%} \frac{d}{38\%}$	$\frac{r}{38\%} \frac{D}{100\%}$																
rP_2	$\frac{R}{39\%} \frac{D}{12\%}$	$\frac{R}{11\%} \frac{d}{38\%}$	$\frac{r}{38\%} \frac{D}{100\%}$																
$\frac{r}{100\%} \frac{d}$	$[R, D] 39\%$	$[R, d] 12\%$	$[r, D] 11\%$																
			$[r, d] 38\%$																
0.25 0.25	5 حساب نسبة المظاهر جديدة التركيب TR: $TR = (230/1000) \times 100 = 23\%$ المسافة الفاصلة بين المورتلين هي: 23 cMg تمثل خريطة عاملية صحيحة.																		
0.5 0.5 0.5	التمرين الثالث (5 نقط) 1 - من 1992 إلى 1994، نلاحظ ارتفاعا ملحوظا في إنتاجية الأنكليس حيث تمر من القيمة 30 طن إلى 83 طن. - من 1994 إلى 1997، نلاحظ انخفاضا كبيرا لإنتاجية الأنكليس حيث تصل إلى قيمة 20 طن. - ابتداء من 1997، نلاحظ شبه استقرار في إنتاجية هذا النوع من الأسماك حيث تتراوح الكمية المنتجة ما بين 20 طن و 30 طن.																		

الصفحة 4	NR 34	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2016 - عناصر الإجابة - مادة: علوم الحياة والأرض - شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية	
0.5 ن	2	أ- المقارنة : مقارنة مع التركيزات العادية لمنظمة الصحة العالمية، يلاحظ ارتفاع تركيز المعادن الثقيلة الثلاث في أعضاء سمك الأنكليس. التفسير: يرجع ارتفاع تركيز المعادن الثقيلة في أعضاء سمك الأنكليس مقارنة بتركيزات العادية المحددة من طرف منظمة الصحة العالمية إلى كون هذا السمك يعيش في مياه ملوثة بمخلفات ناتجة عن الأنشطة الصناعية..... ب- الفرضية التي تم التأكد منها هي الفرضية 2 . التعليق : انخفاض إنتاجية سمك الأنكليس خلال فترة الدراسة راجع إلى تلوث مياه نهر مبيو بمخلفات مصدرها النشاط الصناعي.....	
1 ن		اقتراح تدبيرين من قبيل:	
0.25 ن	3	- معالجة النفايات السائلة الناتجة عن الأنشطة الصناعية قبل طرحها في مياه نهر مبيو.	
0.75 ن		- إنشاء الوحدات الصناعية بعيدا عن مجرى مياه نهر مبيو.....	