

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا  
الدورة العادية 2015  
- الموضوع -

NS 24

ⵜⴰⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴳⴷⴰⵢⵜ | ⵎⴰⵎⴰⵔⴰⵏ  
ⵜⴰⵎⴳⴷⴰⵢⵜ | ⵙⵓⵎⴰⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵎⴰⵔⴰⵏ  
ⵏ ⵙⵓⵎⴰⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵎⴰⵔⴰⵏ



المملكة المغربية  
وزارة التربية الوطنية  
والتكوين المهني

المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

|   |             |                                |                  |
|---|-------------|--------------------------------|------------------|
| 4 | مدة الإنجاز | الرياضيات                      | المادة           |
| 9 | المعامل     | شعبة العلوم الرياضية (أ) و (ب) | الشعبة أو المسلك |

- مدة إنجاز الموضوع هي أربع ساعات.
- يتكون الموضوع من خمسة تمارين مستقلة فيما بينها .
- يمكن إنجاز التمارين حسب الترتيب الذي يرغب فيه المترشح.

- التمرين الأول يتعلق بالأعداد العقدية.....(3 ن)
- التمرين الثاني يتعلق بالحسابيات.....(3 ن)
- التمرين الثالث يتعلق بالبنىات الجبرية.....(4 ن)
- التمرين الرابع يتعلق بالتحليل.....(6.5 ن)
- التمرين الخامس يتعلق بالتحليل.....(3.5 ن)

لا يسمح باستعمال الآلة الحاسبة كيفما كان نوعها

لا يسمح باستعمال اللون الأحمر بورقة التحرير

التمرين الأول: (3 نقط)

1- نعتبر في المجموعة  $\mathbb{C}$  المعادلة التالية:  $(E): z^2 - (5 + i\sqrt{3})z + 4 + 4i\sqrt{3} = 0$

(أ) تحقق أن  $(3 - i\sqrt{3})^2$  هو مميز المعادلة  $(E)$  0.25

(ب) حدد  $a$  و  $b$  حلي المعادلة  $(E)$  (علما أن:  $b \neq a$ ) 0.5

(ج) تحقق أن:  $b = (1 - i\sqrt{3})a$  0.25

2- المستوى العقدي منسوب إلى معلم متعامد و ممنظم و مباشر.  
لتكن  $A$  النقطة التي لحقها  $a$  و  $B$  النقطة التي لحقها  $b$

(أ) حدد العدد العقدي  $b_1$  لحق النقطة  $B_1$  صورة النقطة  $O$  بالدوران الذي مركزه  $A$  وزاويته  $\frac{p}{2}$  0.5

(ب) بين أن  $B$  هي صورة  $B_1$  بالتحاكي الذي مركزه  $A$  ونسبته  $\sqrt{3}$  0.5

(ج) تحقق أن:  $\arg\left(\frac{b}{b-a}\right) \equiv \frac{\pi}{6} [2\pi]$  0.5

(د) لتكن  $C$  نقطة، لحقها  $c$ ، تنتمي إلى الدائرة المحيطة بالمثلث  $OAB$  وتخالف  $O$  و  $A$  0.5

حدد عمدة للعدد العقدي  $\frac{c}{c-a}$

التمرين الثاني: (3 نقط)

ليكن  $x$  عددا صحيحا نسبيا بحيث:  $[2015] 1436$  ؛  $x^{1439}$

1- علما أن:  $1 = 749' 2015 - 1051' 1436$ ، بين أن  $1436$  و  $2015$  أوليان فيما بينهما. 0.25

2- ليكن  $d$  قاسما مشتركا للعددين  $x$  و  $2015$

(أ) بين أن  $d$  يقسم  $1436$  0.5

(ب) استنتج أن  $x$  و  $2015$  أوليان فيما بينهما. 0.5

3- (أ) باستعمال مبرهنة فيرما بين أن:  $[5] 1^{1440} \equiv x$  و  $[13] 1^{1440} \equiv x$  و  $[31] 1^{1440} \equiv x$  0.75

(لاحظ أن:  $2015 = 5.13.31$ )

(ب) بين أن:  $[65] 1^{1440} \equiv x$  ثم استنتج أن:  $[2015] 1^{1440} \equiv x$  0.5

4- بين أن:  $[2015] 1051 \equiv x$  0.5

التمرين الثالث: (4 نقط)

نذكر أن  $(M_2(\mathbb{R}), +, \times)$  حلقة واحدة وحدتها  $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  و أن  $(\mathbb{R}, +)$  زمرة تبادلية.

لكل عدد حقيقي  $x$  نضع:  $M(x) = \begin{pmatrix} 1-x & x \\ -2x & 1+2x \end{pmatrix}$  و نعتبر المجموعة  $E = \{M(x) / x \in \mathbb{R}\}$

نزود  $E$  بقانون التركيب الداخلي  $T$  المعروف بما يلي:  $(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2) \quad M(x)TM(y) = M(x + y + 1)$

1- ليكن  $\varphi$  التطبيق من  $\mathbb{R}$  نحو  $E$  المعروف بما يلي:  $(\forall x \in \mathbb{R}) \quad \varphi(x) = M(x - 1)$

(أ) بين أن  $\varphi$  تشاكل من  $(\mathbb{R}, +)$  نحو  $(E, T)$  0.5

(ب) بين أن  $(E, T)$  زمرة تبادلية. 0.5

2- (أ) بين أن:  $(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2) \quad M(x) \times M(y) = M(x + y + xy)$  0.5

(ب) استنتج أن  $E$  جزء مستقر من  $(M_2(\mathbb{R}), \times)$  وأن القانون " $\times$ " تبادلي في  $E$  0.5

(ج) بين أن القانون " $\times$ " توزيعي بالنسبة للقانون " $T$ " في  $E$ . 0.5

(د) تحقق أن  $M(-1)$  هو العنصر المحايد في  $(E, T)$  وأن  $I$  هو العنصر المحايد في  $(E, \times)$  0.5

3- (أ) تحقق أن:  $(\forall x \in \mathbb{R} - \{-1\}) \quad M(x) \times M\left(\frac{-x}{1+x}\right) = I$  0.25

(ب) بين أن  $(E, T, \times)$  جسم تبادلي. 0.75

التمرين الرابع: (6.5 نقط)

الجزء الأول: لتكن  $f$  الدالة العددية المعرفة على المجال  $[0, +\infty[$  بما يلي:

$$f(0) = 0 \quad \text{و} \quad f(x) = x(1 + \ln^2 x) \quad \text{إذا كان } x > 0$$

ليكن  $(C)$  المنحنى الممثل للدالة  $f$  في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد و منظم  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

1- أحسب:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$  ثم أول مبيانيا النتيجة المحصل عليها. 0.5

2- (أ) بين أن الدالة  $f$  متصلة على اليمين في 0 0.25

(ب) أحسب  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x}$  ثم أول مبيانيا النتيجة المحصل عليها. 0.5

(ج) أحسب  $f'(x)$  من أجل  $x > 0$  ثم استنتج أن الدالة  $f$  تزايدية قطعاً على المجال  $[0, +\infty[$  0.5

3- (أ) بين أن المنحنى  $(C)$  يقبل نقطة انعطاف  $I$  أفصولها  $e^{-1}$ . 0.25

(ب) أدرس الوضع النسبي للمنحنى  $(C)$  بالنسبة للمستقيم الذي معادلته:  $y = x$  0.25

(ج) أنشئ المنحنى  $(C)$ . (نأخذ:  $e^{-1} = 0.4$ ) 0.5

الجزء الثاني: نعتبر المتتالية العددية  $(u_n)_{n \geq 0}$  المعرفة بما يلي:  $u_0 = e^{-1}$  و  $u_{n+1} = f(u_n)$   $(\forall n \in \mathbb{N})$

1- بين بالترجع أن:  $e^{-1} \leq u_n < 1$   $(\forall n \in \mathbb{N})$  0.5

2- بين أن المتتالية  $(u_n)_{n \geq 0}$  تزايدية قطعاً ثم استنتج أنها متقاربة. 0.5

3- نضع:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$

(أ) بين أن:  $e^{-1} \leq l \leq 1$  0.25

(ب) حدد قيمة  $l$  0.5

الجزء الثالث: لتكن  $F$  الدالة العددية المعرفة على المجال  $[0, +\infty[$  بما يلي:  $F(x) = \int_1^x f(t) dt$

1- أ) بين أن الدالة:  $H: x \mapsto -\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x^2 \ln x$  دالة أصلية للدالة:  $h: x \mapsto x \ln x$  على المجال  $]0, +\infty[$  0.25

ب) بين أن:  $(\forall x > 0) \int_1^x t \ln^2(t) dt = \frac{x^2}{2} \ln^2(x) - \int_1^x t \ln(t) dt$  0.5

ج) استنتج أن:  $(\forall x > 0) F(x) = -\frac{3}{4} + \frac{3x^2}{4} - \frac{x^2}{2} \ln(x) + \frac{x^2}{2} \ln^2(x)$  0,5

2- أ) بين أن الدالة  $F$  متصلة على المجال  $[0, +\infty[$  0.25

ب) أحسب  $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x)$  ثم استنتج قيمة التكامل  $\int_0^1 f(x) dx$  0.5

التمرين الخامس: (3.5 نقط)

نعتبر الدالة  $g$  المعرفة على المجال  $[0, +\infty[$  بما يلي:  $g(0) = \ln 2$  و  $g(x) = \int_x^{2x} \frac{e^{-t}}{t} dt$  إذا كان  $x > 0$

1- أ) بين أن:  $(\forall x > 0) (\forall t \in [x, 2x]) e^{-2x} \leq e^{-t} \leq e^{-x}$  0.5

ب) بين أن:  $(\forall x > 0) e^{-2x} \ln 2 \leq g(x) \leq e^{-x} \ln 2$  0.5

ج) استنتج أن الدالة  $g$  متصلة على اليمين في 0. 0.25

2- بين أن الدالة  $g$  قابلة للاشتقاق على المجال  $]0, +\infty[$  ثم أحسب  $g'(x)$  من أجل  $x > 0$  0.75

3- أ) بين أن:  $(\forall t > 0) -1 \leq \frac{e^{-t} - 1}{t} \leq -e^{-t}$  (يمكنك استعمال مبرهنة التزايديات المنتهية) 0.5

ب) بين أن:  $(\forall x > 0) -1 \leq \frac{g(x) - \ln 2}{x} \leq \frac{e^{-2x} - e^{-x}}{x}$  0.5

ج) استنتج أن الدالة  $g$  قابلة للاشتقاق على اليمين في 0. 0.5

انتهى