

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

الدورة العادية 2016

- الموضوع -

NS 24

المملكة المغربية
وزارة التربية الابتدائية
والتكوين المهني



المركز الوطني للتفوييم
والامتحانات والتوجيه

4	مدة الإنجاز	الرياضيات	المادة
9	المعامل	شعبة العلوم الرياضية (أ) و (ب)	الشعبة أو المسار

- مدة إنجاز الموضوع هي أربع ساعات.
- يتكون الموضوع من خمسة تمارين مستقلة فيما بينها .
- يمكن إنجاز التمارين حسب الترتيب الذي يرغب فيه المترشح.

- التمرين الأول يتعلق بالبنيات الجبرية.....(3.5 ن)
- التمرين الثاني يتعلق بالحسابيات.....(3 ن)
- التمرين الثالث يتعلق بالأعداد العقدية.....(3.5 ن)
- التمرين الرابع يتعلق بالتحليل.....(7 ن)
- التمرين الخامس يتعلق بالتحليل.....(3 ن)

لا يسمح باستعمال الآلة الحاسبة كيما كان نوعها

لا يسمح باستعمال اللون الأحمر بورقة التحرير

التمرين الأول: (3.5 نقط)

$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ و أن $(\mathbb{C}, +, \times)$ جسم تبادلي.

$$E = \{M(x, y) ; (x, y) \in \mathbb{R}^2\}, \quad M(x, y) = \begin{pmatrix} x+y & 0 & -2y \\ 0 & 0 & 0 \\ y & 0 & x-y \end{pmatrix}$$

لكل $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ نضع: $(M_3(\mathbb{R}), +)$

1- بين أن E زمرة جزئية للزمرة $(M_3(\mathbb{R}), +)$ 0.5

2- تحقق أن: 0.5

$$(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2) \quad (\forall (x', y') \in \mathbb{R}^2) : M(x, y) \times M(x', y') = M(xx' - yy', xy' + yx')$$

3- نضع $\varphi : \mathbb{C}^* \rightarrow E^*$ ونعتبر التطبيق: φ الذي يربط العدد العقدي $z = x + iy$ بالمصفوفة

$M(x, y)$ من E , حيث الزوج (x, y) من \mathbb{R}^2

(أ) بين أن φ تشكل من (\mathbb{C}^*, \times) نحو (E, \times) 0.25

ب) استنتاج أن (E^*, \times) زمرة تبادلية وأن عناصرها المحايد هو $M(1, 0)$ 0.75

4- بين أن $(E, +, \times)$ جسم تبادلي. 0.5

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(أ) أحسب $A \times M(x, y)$ من أجل $M(x, y)$ عنصر من E 0.5

ب) استنتاج أن كل عنصر من عناصر E لا يقبل مماثلا في $(M_3(\mathbb{R}), \times)$ 0.5

التمرين الثاني: (3 نقط)الجزء الأول: يكن (a, b) عنصرا من $\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ بحيث العدد الأولي 173 يقسم $a^3 + b^3$

1- بين أن: $[173] \quad a^{171} \equiv -b^{171}$ (لاحظ أن: $171 = 3 \times 57$) 0.25

2- بين أن: 173 يقسم a إذا وفقط إذا كان 173 يقسم b 0.25

3- نفترض أن 173 يقسم a . بين أن 173 يقسم $a+b$ 0.25

4- نفترض أن 173 لا يقسم a

(أ) باستعمال مبرهنة فيرما بين أن: $[173] \quad a^{172} \equiv b^{172}$ 0.5

ب) بين أن: $a^{171}(a+b) \equiv 0 \quad [173]$ 0.5

ج) استنتاج أن 173 يقسم $a+b$ 0.5

الجزء الثاني: نعتبر في $\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ المعادلة التالية:

ليكن (x, y) عنصرا من $\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ حل للمعادلة (E) ؛ نضع: $x + y = 173k$ ، حيث

$$k(x-y)^2 + (k-1)xy = 1 \quad 0.25$$

$$\text{1- تتحقق أن: } k=1 \quad 0.5$$

$$\text{2- بين أن: } k=1 \text{ ثم حل المعادلة } (E). \quad 0.5$$

التمرين الثالث: (3.5 نقط)

المستوى العقدي منسوب إلى معلم متعدد و منظم و موجه (O, \bar{u}, \bar{v}) .

نعتبر نقطتين M_1 و M_2 من المستوى العقدي بحيث النقط O و M_1 و M_2 مختلفة متى و غير مستقيمية.

ليكن z_1 و z_2 لاحي M_1 و M_2 على التوالي و لتكن M النقطة التي لحقها z يحقق العلاقة:

$$z = \frac{2z_1 z_2}{z_1 + z_2}$$

$$\text{1- (أ) بين أن: } \frac{z_1 - z}{z_2 - z} \times \frac{z_2}{z_1} = -1 \quad 0.5$$

ب) استنتج أن النقطة M تنتهي إلى الدائرة المحيطة بالمثلث OM_1M_2 0.5

2- بين أنه إذا كانت $z_1 = \bar{z}_2$ فإن M تنتهي إلى المحور الحقيقي. 0.5

3- نفترض أن M_2 هي صورة M_1 بالدوران r الذي مرکزه O و قياس زاويته α حيث α ينتمي إلى $[0, \pi]$ 0.5

(أ) احسب z_2 بدلالة z_1 و α 0.5

ب) استنتاج أن النقطة M تنتهي إلى واسط القطعة $[M_1 M_2]$ 0.5

4- ليكن θ عددا حقيقيا معلوما من $[0, \pi]$ 0.5

نفترض أن z_1 و z_2 هما حل المعادلة:

$$6t^2 - (e^{i\theta} + 1)t + (e^{i\theta} - 1) = 0$$

$$\text{أ) بدون حساب } z_1 \text{ و } z_2 \text{ تتحقق أن: } z = 2 \frac{e^{i\theta} - 1}{e^{i\theta} + 1} \quad 0.5$$

ب) أعط الصيغة المثلثية للعدد العقدي z بدلالة θ . 0.5

التمرين الرابع: (7 نقط)

الجزء الأول:

1- بتطبيق مبرهنة التزايدات المنتهية على الدالة $t \mapsto e^{-t}$ ، بين أنه لكل عدد حقيقي موجب قطعا x يوجد عدد حقيقي

$$e^\theta = \frac{x}{1 - e^{-x}} \quad \theta \text{ محصور بين } 0 \text{ و } x \text{ بحيث:} \quad 0.5$$

2- استنتاج أن:

$$(\forall x > 0) ; \quad 1 - x < e^{-x} \quad (أ) \quad 0.25$$

$$(\forall x > 0) ; \quad x + 1 < e^x \quad (ب) \quad 0.25$$

$$(\forall x > 0) ; \quad 0 < \ln\left(\frac{xe^x}{e^x - 1}\right) < x \quad (ج) \quad 0.25$$

الجزء الثاني:

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $[0, +\infty]$ بما يلي: $f(0) = 1$ و $f'(0) = 0$ إذا كان

HAF

و ليكن (C) المنحنى الممثّل للدالة f في المستوى المنسوب إلى معلم متّعّم منظم (O, \bar{i}, \bar{j})	
- أ) بين أن الدالة f متّصلة على اليمين في 0	0.5
ب) بين أن: $0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x)$ ثم أول مبيانا النتيجة المحصل عليها.	0.5
2- أ) بين أن: $(\forall x \geq 0) \quad x - \frac{x^2}{2} \leq -e^{-x} + 1$ (يمكّنك استعمال نتيجة السؤال 2-أ) من الجزء الأول)	0.25
ب) استنتاج أن: $(\forall x \geq 0) \quad \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} \leq e^{-x} + x - 1 \leq \frac{x^2}{2}$	0.5
3- أ) تحقق أن: $(\forall x > 0) \quad \frac{f(x) - 1}{x} = \frac{e^{-x} + x - 1}{x^2} f(x)$	0.5
ب) استنتاج أن: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - 1}{x} = \frac{1}{2}$ ثم أول النتيجة المحصل عليها.	0.75
4- أ) بين أن الدالة f قابلة للاشتقاق على المجال $[0, +\infty]$ وأن $f'(x) = \frac{e^x(e^x - 1 - x)}{(e^x - 1)^2}$	0.75
ب) استنتاج أن الدالة f تزايدية قطعا على $[0, +\infty]$. (يمكّنك استعمال نتيجة السؤال 2-ب) من الجزء الأول)	0.5
<u>الجزء الثالث:</u>	
نعتبر المتّالية العددية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة بما يلي: $u_0 > 0$ و $u_{n+1} = \ln(f(u_n))$ لكل عدد صحيح طبيعي n	
1- بين أنه لكل عدد صحيح طبيعي n لدينا: $u_n > 0$	0.5
2- بين أن المتّالية $(u_n)_{n \geq 0}$ تنقصصية قطعا ثم استنتاج أنها متقاربة. (يمكّنك استعمال نتيجة السؤال 2-ج) من الجزء الأول)	0.5
3- بين أن 0 هو الحل الوحيد للمعادلة: $\ln(f(x)) = x$ ثم حدد نهاية المتّالية $(u_n)_{n \geq 0}$	0.5
<u>التمرين الخامس: (3 نقط)</u>	
نعتبر الدالة العددية F المعرفة على المجال $I = [0, +\infty]$ بما يلي: $F(x) = \int_{\ln 2}^x \frac{1}{\sqrt{e^t - 1}} dt$	
1- أدرس إشارة $F(x)$ لكل x من I	0.5
ب) بين أن الدالة F قابلة للاشتقاق على المجال I و احسب $F'(x)$ لكل x من I .	0.5
ج) بين أن الدالة F تزايدية قطعا على المجال I	0.25
2- أ) باستعمال تقنية تغيير المتغير و ذلك بوضع: $u = \sqrt{e^x - 1}$ ، بين أنه لكل x من I لدينا:	
$\int_{\ln 2}^x \frac{1}{\sqrt{e^t - 1}} dt = 2 \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{\pi}{2}$	0.5
ب) احسب: $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x)$	0.5
3- أ) بين أن الدالة F تقابل من المجال I نحو مجال J يتم تحديده.	0.25
ب) حدد التقابل العكسي F^{-1} للتقابل F .	0.5

انتهى

HAD